


# Come proteggere gli animali da affezione dai parassiti

## Raccomandazioni generali



Il controllo delle infestazioni parassitarie dovrebbe essere effettuato almeno ogni 12 mesi in concomitanza con il check-up annuale.




Le sabbie dei giochi per i bambini vanno sempre coperte quando non sono utilizzate.



Lavare accuratamente la frutta e la verdura da consumarsi crude.



Garantire una corretta igiene delle mani, soprattutto nei bambini.



L'alimentazione degli animali domestici con carne cruda deve essere scoraggiata e va sempre garantita la disponibilità di acqua fresca.



Le feci devono essere raccolte immediatamente quando si è in passeggiata e quelle deposte in giardino vanno eliminate giornalmente. Non compostare feci di cane e gatto se si utilizza il compost per l'orto o per colture destinate al consumo alimentare. Lavarsi le mani dopo lo smaltimento delle feci.



## Proteggere gli animali da affezione dai parassiti interni



## Proteggere gli animali da affezione dagli ectoparassiti

- Per mantenere la salute individuale e per evitare la contaminazione ambientale con uova di *Toxocara* **cuccioli e gattini devono essere trattati contro i nematodi ogni 14 giorni fino a 14 giorni dopo lo svezzamento**. Il trattamento deve essere iniziato a 14 giorni di età per i cuccioli e a 21 giorni di età per i gattini e, in concomitanza, occorre anche trattare la madre.
- **Per progettare gatti e cani dai nematodi intestinali e polmonari che hanno accesso all'esterno, occorre effettuare la sverminazione 4-12 volte all'anno** (in base alla possibilità che questi possano ingerire lumache, chioccioline o erba). I soggetti che non hanno accesso all'esterno, o che hanno un accesso limitato, possono invece essere trattati 1-2 volte all'anno. In alternativa, occorre effettuare degli esami copromicroscopici con le stesse tempistiche e trattare in base ai risultati degli esami.
- In aree endemiche per *Echinococcus granulosus*, i cani che possono avere accesso a frattaglie o carcasse di bestiame devono essere trattati con un elminticida specifico **almeno ogni 6 settimane**.
- Nelle aree endemiche per *Echinococcus multilocularis*, i cani che possono cacciare e mangiare piccole prede devono essere trattati **mensilmente** con un prodotto efficace contro questo parassita.
- Nelle aree dove la **filariosi** è endemica i **farmaci per la prevenzione stagionale** devono essere somministrati a cani, gatti e furetti in base alla situazione epidemiologica locale. I cani in aree endemiche dovrebbero essere testati annualmente per l'infezione da filaria così come dovrebbero venir testati prima della somministrazione dei farmaci usati per la prevenzione.
- Il trattamento preventivo di routine contro i parassiti gastro-intestinali e polmonari è regolamentato dalla legislazione dei singoli paesi. Solo il Medico Veterinario è in grado di suggerire i trattamenti più adeguati in base alle condizioni epidemiologiche locali, alla *compliance* del proprietario (es. il desiderio di un approccio a "rischio zero") e ai fattori di rischio individuali (frequenza aree a rischio, anamnesi storica, alimentazione con carne cruda, ecc.). I trattamenti antiparassitari devono pertanto essere effettuati sempre su prescrizione del Medico Veterinario.

- Il rischio di **infestazione da pulci**, per gli animali domestici, è presente tutto l'anno e l'esposizione è difficile da evitare. La decisione di utilizzare prodotti antipulci dovrebbe essere effettuata in base al rischio, ma i proprietari devono essere consapevoli che, se la profilassi di routine non viene eseguita, per eliminare l'infestazione una volta in corso sono necessari almeno 3 mesi. Il trattamento profilattico va abbinato al controllo ambientale.
- **La prevenzione contro le zecche** dovrebbe essere consigliata per cani e gatti a rischio di infestazione. Questo rischio aumenta durante la stagione di maggiore attività delle zecche, ma in molte aree, per cani e gatti particolarmente esposti, il rischio è reale durante tutto l'anno.
- Nelle aree endemiche per l'infestazione da *Leishmania*, i cani devono essere trattati mensilmente con prodotti repellenti per i flebotomi. Nei gatti la necessità del trattamento preventivo dovrebbe essere invece consigliata in base al rischio individuale.
- Proteggere la salute dei nostri animali da affezione significa anche salvaguardare la sanità pubblica e preservare il legame tra uomo e animali.

**Proteggere la salute dei nostri animali da affezione significa anche salvaguardare la sanità pubblica e preservare il legame tra uomo e animali**