


Схема індивідуальної дегельмінтизації собак



ДОДАТКОВІ ОБРОБКИ ДЛЯ СОБАК	
Круглі гельмінти	
Щенята	З 2-тижневого віку, потім кожні 14 днів до 2 тижнів після відлучення, а потім щомісячне лікування до шестимісячного віку.
Вагітні суки	Для зменшення передачі гельмінтів щенятам від вагітних самок можна давати макроциклічні лактони на 40-й та 55-й день вагітності або фенбендазол щодня з 40-го дня вагітності аж до другої доби після пологів.
Лактуючі суки	Слід обробляти одночасно з першою обробкою щенят (див. вище).
Собаки з підвищеним ризиком зараження - ті, які використовуються в спорті, змаганнях, на виставках або утримуються в розплідниках тощо.	Два способи обробки: максимум за 4 тижні до і 2-4 тижні після події. Для розплідників: використовувати планові дегельмінтизації раз на місяць або досліджувати фекалії кожні чотири тижні та обробляти відповідно до результатів.
Професійні собаки - поводитири, рятувальні або поліцейські собаки	Залежно від оцінки ризику, дегельмінтизуйте або досліджуйте фекалії щомісяця та обробляйте згідно з результатами дослідження.
Собаки, що живуть в помешканні, де є діти віком до 5 років або особи з послабленим імунітетом	Залежно від ступеня ризику, дегельмінтизуйте або досліджуйте фекалії щомісяця та обробляйте згідно з результатами дослідження.
Стьожкові гельмінти	
Подорож чи ввіз до/з ендемічних регіонів щодо <i>Echinococcus</i> spp.	Собак з високим ризиком зараження слід обробляти через 4 тижні після початку подорожі, потім кожні 4 тижні до 4 тижнів після повернення. Після ввезення рекомендується негайне обстеження та лікування.
Живиться сирим м'ясом та / або субпродуктами, їсть здобич або полює	Собак слід обстежувати кожні 2-3 місяці шляхом дослідження фекалій та за результатами обробляти або дегельмінтизувати кожні 6 тижнів.
Зараження шляхом розжовування та ковтання блох або вошей (як переносників <i>Dipylidium</i>)	Відразу, як встановлено зараженість.
Серцеві гельмінти (<i>Dirofilaria immitis</i>)*	
Собаки, що живуть у ендемічних регіонах серцевих гельмінтів	Профілактична обробка проти личинкової стадії макроциклічними лактонами з місячним інтервалом впродовж сезону льоту комарів.
Подорож чи ввіз до/з ендемічних регіонів щодо серцевих гельмінтів	Не пізніше 30 днів після відправлення до 30 днів після останньої можливої дати подорожі з місячним інтервалом.

- Дегельмінтизація під наглядом ветеринара. Регулярне дослідження фекалій, як це пропонується у групах А і В, є хорошою альтернативою стандартним схемам дегельмінтизації.
- Якщо індивідуальний ризик для тварини не можна чітко оцінити, тварину слід оглянути або продегельмінтизувати щонайменше 4 рази на рік. Дослідження виявили, що проведення дегельмінтизації 1-3 рази на рік не забезпечує достатнього захисту. Дегельмінтизація кожні 3 місяці не обов'язково усуває виявлені інвазії.

* Детальну інформацію щодо зараженості серцевими гельмінтами собак і котів можна знайти в Рекомендаціях ESCCAP №5: Контроль трансмісивних хвороб серед собак й котів дивіться на www.esccap.org.ua