


# Ako chrániť domácich miláčikov pred parazitmi

## Základné hygienické opatrenia



V rámci každoročnej preventívnej prehliadky konzultujte s majiteľom aj prevenciu pred parazitmi.




Odporučte majiteľovi, aby zakryl pieskoviská, keď sa nepoužívajú.



Poukážte na dôležitosť dôkladného umývania všetkého ovocia a zeleniny pred konzumáciou.



Dbajte na hygienu rúk, najmä u detí.



Odporučte majiteľovi, aby nekrmil domácich miláčikov nespracovaným surovým mäsom a zabezpečil im prístup k čerstvej vode.



Odporučte majiteľovi, aby okamžite zbieral výkaly zo záhrady a pri prechádzkach so psom, a následne si umyl ruky. Vysvetlite mu, že výkaly nepatria do kompostu, ak je kompost určený na pestovanie plodín.



## Ochrana domácich zvierat pred endoparazitmi



## Ochrana domácich miláčikov pred ektoparazitmi

- Pre zachovanie zdravia a zabránenie kontaminácie prostredia vajíčkami škrkaviek (*Toxocara* spp.), **odčervujte šteniatka a mačiatka každých 14 dní až do 2 týždňov po odstavení**. Liečbu začnite vo veku 14. dní u šteniatok a 21. dní u mačiatok, a súčasne odčervujte aj matku.
- **Odčervujte dospelé mačky a psy s prístupom von 4 až 12-krát ročne** (v závislosti od ich individuálnej tendencie požírať slimáky, slizniaky alebo trávu), aby ste ich chránili pred črevnými a pľúcnyimi červami. Zvieratá bez prístupu von, alebo s veľmi obmedzeným prístupom, by mali byť ošetrené 1 až 2-krát ročne. Alternatívou je parazitologické vyšetrenie trusu v rovnakých intervaloch a následná liečba na základe výsledkov vyšetrenia.
- V oblastiach s endemickým výskytom *Echinococcus granulosus* liečte psy s prístupom k vnútornostiam alebo kadáverom hospodárskych zvierat vhodným antiparazitárnym prípravkom minimálne **raz za 6 týždňov**.
- V oblastiach s endemickým výskytom *Echinococcus multilocularis* liečte psy, ktoré majú tendenciu loviť a požírať drobné cicavce prípravkom účinným proti tomuto parazitovi **raz za mesiac**.
- V krajinách s endemickým výskytom **srdcových červov** zabezpečte u psov, mačiek a fretiek sezónne preventívne ošetrenie. Pred podaním preventívneho prípravku spoločenské zvieratá vyšetrite na prítomnosť srdcových červov.
- Rutinná liečba proti parazitickým červom a prevencia proti pľúcnyim červom závisí od legislatívy v jednotlivých krajinách, prístupu veterinárov, ktorí zohľadnia epidemiologickú situáciu v regióne, predstavy majiteľov zvierat (napríklad túžba po „nulovom riziku“), aj od individuálneho zhodnotenia rizika (sklon k lovu, predchádzajúca infekcia pľúcnyimi červami, podávanie surovej stravy a pod.). Postupy odčervenia by preto vždy mali byť založené na odporúčaní veterinárneho lekára.

- **Infestácia bľchami** predstavuje riziko po celý rok a je ťažké sa mu vyhnúť. Rozhodnutie používať preventívne produkty proti bľchám by malo byť založené na zhodnotení rizika. Je potrebné upozorniť majiteľov, že v prípade infestácie bľchami môže trvať minimálne 3 mesiace kým sa podarí bľchy odstrániť. Profylaktická liečba by mala byť používaná spolu s kontrolou prostredia.
- Odporučte **prevenciu proti kliešťom** pre mačky a psy, ktoré sú vystavené vysokému riziku. Toto riziko bude väčšie počas sezóny kliešťov, ale v niektorých krajinách môže pretrvávajúť celoročne.
- V oblastiach endemických pre *Leishmania* spp., liečte psy mesačne produktmi odpudzujúcimi kútočky. Repelent používajte aj u mačiek s rizikom kontaktu s prenášačom parazita.

Ochrana zdravia domácich miláčikov, zvyšovanie bezpečnosti ľudí a zachovanie vzťahu medzi človekom a zvieratom