Schéma individuálneho odčervovania mačiek

Mačka žijúca v interiéri

Mačka žije výlučne v interiéri alebo má prístup len na ohradenú terasu alebo záhradu. Je nepravdepodobné, že by lovila hlodavce alebo inú korisť.

Mačka sa voľne pohybuje

Mačka má neobmedzený prístup do vonkajšieho prostredia a priamy kontakt s inými mačkami. Nedá sa vylúčiť lovenie a požieranie hlodavcov alebo inej koristi.

RIZIKOVÁ SKUPINA A

Odčerviť 1–2 krát ročne proti črevným nematódam alebo vyšetriť trus a liečiť na základe výsledkov vyšetrenia

RIZIKOVÁ SKUPINA B

Odčerviť 4–12 krát ročne proti črevným nematódam alebo vyšetriť trus a liečiť podľa výsledkov vyšetrenia

Odčerviť 4–12 krát ročne proti pásomniciam

DOPLNKOVÉ OŠETRENIA PRE MAČKY	
Oblé červy	
Mačiatka	Prvýkrát vo veku troch týždňov, potom každé 2 týždne až do odstavenia. Ak pretrváva zvýšené riziko infekcie (napr. možnosť neobmedzeného pohybu), ošetrenie raz za mesiac až do veku šiestich mesiacov.
Gravídne mačky	Jednorazové ošetrenie emodepsidom vo forme spot-on prípravku približne sedem dní pred očakávaným pôrodom zabraňuje laktogénnemu prenosu lariev *Toxocara cati* na mačiatka.
Laktujúce mačky	Odčerviť pri prvom ošetrení mačiatok (3 týždne po pôrode).
Mačky so zvýšeným rizikom infekcie, napr. chované na súťaže, výstavy alebo v útolkoch, a pod.	Dve ošetrenia: najneskôr 2 týždne pred a 2-4 týždne po udalosti. Pre chovné stanice: použiť odčervovanie podľa plánu raz za mesiac, alebo každé štyri týždne vyšetriť vzorky trusu a liečiť podľa výsledkov.
Mačky chované v domácnostiach s deťmi mladšími ako 5-6 rokov, imunokompromitovanými alebo staršími osobami	V závislosti od vyhodnotenia rizika použiť odčervovanie podľa plánu raz za mesiac, alebo raz za mesiac vyšetriť vzorky trusu a liečiť podľa výsledkov.
Pásomnice	
Kŕmenie surovým mäsom a/alebo vnútornosťami, lovenie a požieranie koristi	Mačky by mali minimálne 4 krát ročne podstúpiť vyšetrenie trusu a liečbu podľa nálezu, alebo by mali byť aspoň 4 krát ročne odčervené. Z infekcií pásomnicami u mačiek prevláda infekcia *Hydatigera taeniaeformis* (predtým *Taenia taenieformis*). Mačky žijúce v oblastiach s endemickým výskytom *Echinococcus multilocularis* (pásomnica líščia) a loviace hlodavce, môžu vylučovať infekčné vajíčka a predstavovať tak riziko pre človeka. V porovnaní so psami je však riziko vylučovania vajíčok u mačiek výrazne nižšie. Toto riziko je ešte možné minimalizovať častejším odčervovaním; ošetrenie raz za mesiac (12 krát ročne) zabraňuje vylučovaniu vajíčok.
Napadnutie blchou (prenášač *Dipylidium*)	Jednorazovo pri potvrdenej infestácii.
Pľúcne červy (*Aelurostrongylus abstrusus*, *Troglostrongylus* spp.)	
Mačky s prístupom do vonkajšieho prostredia, kde môžu požierať slimáky alebo slizniaky a loviť ďalších paratenických hostiteľov ako sú vtáky, plazy alebo myši	Preventívne ošetrenie proti pľúcnym červom v mesačných intervaloch počas celého roka.
Srdcový červ (*Dirofilaria immitis*)**	
Mačky žijúce v oblastiach s endemickým výskytom *Dirofilaria immitis*	Ošetrenie proti larvám tretieho štádia makrocyklickými laktónmi v mesačných intervaloch počas sezóny výskytu komárov a 30 dní po jej skončení.
Cestovanie do oblastí s endemickým výskytom *Dirofilaria immitis*	Počas sezóny výskytu komárov: profylaktické ošetrenie proti larvám tretieho štádia makrocyklickými laktónmi do 30 dní od príchodu do endemickej oblasti, následne ďalšie ošetrenia v mesačných intervaloch až do 30 dní po návrate.
Dovoz z oblastí s endemickým výskytom *Dirofilaria immitis*	Bezprostredne po dovoze: jednorazové profylaktické ošetrenie proti larvám tretieho štádia a mikrofiláriám makrocyklickými laktónmi. Vstupné vyšetrenie na prítomnosť infekcie ihneď pri dovoze a opakované testovanie najskôr o 6 mesiacov.

- **Odčervovanie by sa malo vždy vykonávať na základe odporúčania veterinárneho lekára. Pravidelné koprologické vyšetrenie trusu (a v prípade potreby následné odčervenie), ktoré sa odporúča pre rizikové skupiny A a B, môže byť vhodnou alternatívou k štandardnému odčervovaniu, ak sa vykonáva s rovnakou frekvenciou.**
- **Ak nie je možné jednoznačne posúdiť individuálne riziko infekcie črevnými nematódami, mačku je potrebné odčerviť alebo vyšetriť jej trus aspoň 4-krát ročne. To isté platí aj pre infekciu pásomnicami, hoci spoľahlivosť detekcie infekcie pásomnicami vyšetrením trusu je nižšia (s výnimkou *Dipylidium*, pri ktorom test na koproantigén umožňuje detekciu s vysokou citlivosťou). Preto sa odporúča odčervenie proti pásomniciam aspoň 4-krát ročne. Štúdie preukázali, že 1–3 odčervenia ročne neposkytujú dostatočnú ochranu. Odčervovanie každé 3 mesiace nemusí nevyhnutne zabrániť vzniku patentných infekcií.**

** **Podrobné informácie o infekcii srdcovým červom u psov a mačiek nájdete v smernici ESCCAP č. 5: Prevencia ochorení/patogénov prenášaných vektormi u psov a mačiek**

ESCCAP SK & CZ. Parazitologický ústav SAV, v. v. i. Hlinkova 3
040 01 Košice. Slovensko. Tel: +421(0) 55 633 44 55