




ANTIHELMÍNTICOS PARA PERROS DISPONIBLES EN ESPAÑA 2026*



| Nombre comercial Laboratorio distribuidor | Principios activos | Dosificación (**) | Forma farmacéutica | Indicaciones de uso | Precauciones especiales de uso | Equivalentes terapéuticos (laboratorio distribuidor) |
|--|--|--|--|--|--|--|
| Advocate - ELANCO | Imidacloprid + Moxidectina | 10 mg/kg + 2,5 mg/kg | Spot on | Nematodos ^{A+L} Prevención dirofilariosis Vermes pulmonares Thelaziosis Ectoparásitos (no garrapatas) | Edad mínima: 7 semanas Peso mínimo: 1 kg Uso NO recomendado en gestantes, lactantes y reproductores | Imoxat (LIVSTO); Prinovox (FATRO) |
| Alphafubren - KARIZOO | Flubendazol | 22 mg/Kg ⁽³⁾ | Gel oral | Nematodos | Teratogénico y tóxico para el feto a dosis elevadas | — |
| Bravecto TriUno - MSD | Fluralaner + Moxidectina + Pirantel | 10-20 mg/kg + 0,025-0,05 mg/kg + 5-10 mg/kg | Comprimidos masticables | Nematodos ^{A+L} Prevención dirofilariosis Vermes pulmonares Ectoparásitos | Edad mínima: 8 semanas Peso mínimo: 1,27 kg Precaución en perros con trastornos neurológico Uso NO recomendado en gestantes, lactantes y reproductores | — |
| Cardotek 30 Plus - BOEHRINGER INGELHEIM | Ivermectina + Pirantel | 6 µg/kg + 5 mg/kg | Comprimidos masticables | Nematodos Prevención dirofilariosis | Edad mínima: 6 semanas Puede utilizarse en gestantes y lactantes | — |
| Credelio Plus - ELANCO | Lotilaner + Milbemicina oxima | 20-41 mg/kg + 0,75-1,53 mg/Kg | Comprimidos masticables | Nematodos Prevención dirofilariosis Vermes pulmonares Ectoparásitos | Edad mínima: 8 semanas Peso mínimo: 1,4 kg Seguridad NO demostrada en gestantes, lactantes y reproductores | — |
| Dosalid - ZOETIS | Epsiprantel + Pirantel | 5,5 mg/kg + 5 mg/kg | Comprimidos | Nematodos Cestodos | Edad mínima: 4 semanas Su uso en animales destinados a la reproducción puede producir un descenso en el índice de fertilidad y de partos | — |
| Droncit - VETOQUINOL | Praziquantel | 5 mg/kg | Comprimidos | Cestodos | Sin contraindicaciones en gestantes y lactantes | Canitenol-BT (SYVA); Overcid (OVEJERO); Tenicipen (FATRO IBÉRICA) |
| Drontal suspensión oral para cachorros y perros jóvenes - VETOQUINOL | Febantel + Pirantel | 15 mg/kg + 5 mg/kg (1 ml/kg) | Suspensión oral | Nematodos | Edad mínima: 2 semanas Peso mínimo: 0,6 kg NO utilizar en gestantes y lactantes | — |
| Drontal Plus - VETOQUINOL | Febantel + Pirantel + Praziquantel | 15 mg/kg + 5 mg/kg + 5 mg/kg | Comprimidos | Nematodos Cestodos Protozoos: <i>Giardia duodenalis</i> ⁽⁵⁾ | Peso mínimo: 2 kg Puede utilizarse en gestantes (último tercio de gestación) y lactantes | Canitenol Plus 50 mg (SYVA); Cazitel (ZOETIS); Cestem (CEVA); Endogard (VRBAC); Helm-EX (KARIZOO); Prazitel (ECUPHAR); Wellplus (DIVASA FARMAVIC); Zikyall (HIFARMAX); Zipyran Plus (CALIER) |
| Guardian SR inyectable - ELANCO | Moxidectina | 0,17 mg/kg (0,05 ml/kg) | Inyectable | Nematodos ^{A+L} Prevención dirofilariosis | Edad mínima: 12 semanas. Puede utilizarse en gestantes y lactantes | Aflaria inyectable (FATRO) |
| Immiticide - BOEHRINGER INGELHEIM | Melarsomina diclorhidrato | 2,14 mg/kg (1ml/10 kg) | Inyectable | Tratamiento <i>Dirofilaria immitis</i> (adulticida) | NO utilizar en gestantes | — |
| Milbemax - ELANCO | Milbemicina oxima + Praziquantel | 0,5 mg/kg + 5 mg/kg | Comprimidos Comprimidos masticables | Nematodos Cestodos Prevención dirofilariosis Vermes pulmonares Thelaziosis | Edad mínima: 2 semanas Peso mínimo: 0,5 kg Puede utilizarse en gestantes y lactantes | Alpramil (ECUPHAR); Milbeguard Duo (CEVA); Milbenin (KIMIPHARMA); Milprazon (LABIANA); Milpro (VRBAC) |
| Nexgard Spectra - BOEHRINGER INGELHEIM | Afoxolaner + Milbemicina oxima | 2,50-5,36 mg/kg + 0,50-1,07 mg/kg | Comprimidos masticables | Nematodos Prevención dirofilariosis Vermes pulmonares Thelaziosis Ectoparásitos | Edad mínima: 8 semanas Peso mínimo: 1,35kg Puede utilizarse en gestantes, lactantes y reproductoras. Seguridad NO demostrada en machos reproductores | — |
| Panacur comprimidos - MSD | Fenbendazol | 20 - 100 mg/kg ⁽³⁾ | Comprimidos | Nematodos Cestodos Protozoos: <i>Giardia duodenalis</i> | Sin contraindicaciones en gestantes y lactantes | — |
| Panacur pasta oral - MSD | Fenbendazol | 50 mg/kg ⁽³⁾ | Pasta oral | Nematodos Protozoos: <i>Giardia duodenalis</i> | Peso mínimo: 1 kg Puede utilizarse en gestantes a partir del día 39 de gestación | — |
| Procox - VETOQUINOL | Emodepsida + Toltrazurilo | 0,45 mg/kg + 9 mg/kg (0,5 ml/kg) | Suspensión oral | Nematodos ^{A+L} Protozoos: coccidios | Edad mínima: 2 semanas Peso mínimo: 0,4 kg Uso NO recomendado en gestantes y lactantes de menos de 2 semanas | — |
| Profender - VETOQUINOL | Emodepsida + Praziquantel | 1 mg/kg + 5 mg/kg | Comprimidos | Nematodos ^{A+L} Cestodos | Edad mínima: 12 semanas Peso mínimo: 1 kg Administrar únicamente a perros en ayunas Puede utilizarse en gestantes y lactantes | — |
| Popandog - FATRO IBÉRICA | Fenbendazol + Embonato de pirantel + Praziquantel | 20 mg/kg + 14,4 mg/kg + 5 mg/kg | Comprimidos | Nematodos Cestodos | Edad mínima: 6 semanas NO utilizar durante las cuatro primeras semanas de gestación | — |
| Simparica Trio - ZOETIS | Sarolaner + Moxidectina + Pirantel | 1,2-2,4 mg/kg + 0,024-0,048 mg/kg + 5-10 mg/kg | Comprimidos masticables | Nematodos ^{A+L} Prevención dirofilariosis Vermes pulmonares Thelaziosis Ectoparásitos | Edad mínima: 8 semanas Peso mínimo: 1,25 kg Uso NO recomendado en gestantes, lactantes y reproductores | — |
| Stronghold - ZOETIS | Selamectina | 6 mg/kg | Spot on | Nematodos Prevención dirofilariosis Ectoparásitos (no garrapatas) | Edad mínima: 6 semanas Puede utilizarse en gestantes, lactantes y reproductores | Chanhold (FATRO IBÉRICA); Selehold (LABIANA PETS); Evicto (VRBAC) |
| Telmin Unidia - ECUPHAR | Mebendazol | 20 mg/kg ⁽³⁻⁵⁾ | Comprimidos Suspensión oral | Nematodos ⁽³⁾ Cestodos ⁽³⁾ | NO utilizar durante los primeros dos tercios de gestación | — |
| Virbaminthe - VIRBAC | Nicosamida + Oxibendazol | 120 mg/kg + 15 mg/kg | Pasta oral | Nematodos Cestodos | Edad mínima: 2 semanas Sin contraindicaciones en gestantes y lactantes | - |

(*) Información obtenida de las fichas técnicas registradas en la AEMPS
 (**) Frecuencia de administración: seguir criterio de la clasificación de ESCCAP en función de los riesgos
 (3) Suministrar 3 días consecutivos
 (5) Suministrar 5 días consecutivos
 A+L: Adulticida y larvicida

