

Principales spécialités INSECTICIDES et/ou ACARICIDES pour le traitement des CHATS en France en décembre 2024

Spécialités	Molécules	Galénique	Age/ poids minimum	Gestation/ Lactation	Puces	Tiques	Poux	Otodectes	Nématodes gastro-intestinaux	Autres
Advantage®	imidacloprid	spot-on surf	8 sem.	NR						
Advocate®	imidaclopride + moxidectine	spot-on sys	9 sem., 1 kg	NR						Larves <i>D. immitis</i> , nématodes pulmonaires, <i>T. callipaeda</i> , <i>N. cati</i>
Bravecto®	fluralaner	spot on sys	9 sem., 1,2 kg	NR						
Bravecto® Plus	fluralaner + moxidectine	spot on sys	9 sem., 1,2 kg	NR						Larves <i>D. immitis</i> , <i>A. abstrusus</i>
Capstar®	nitenpyram	comprimés	4 sem., 1kg	AU						
Credelio®	lotilaner	comprimés	8 sem., 0,5 kg	NR						
Felpreva®	emodepside, praziquantel, tigolaner	spot on	10 sem., 1 kg	PAU						Strongles respiratoires + cestodes, <i>N. cati</i>
Fiprokil duo®	fipronil + pyriproxifène	spot on	10 sem., 1 kg	NR						
Frontline®, Frontline Combo®	fipronil (S-methoprène)	spot on surf, spray	8 sem., 1 kg	AU						
Nexgard® Combo	ésafoxolaner + eprinomectine + praziquantel	spot on (syst)	8 sem., 0,8 kg	AU						Nématodes respiratoires et urinaires, cestodes + larves <i>D. immitis</i> + <i>N. cati</i>
Oridermyl®	Perméthrine, néomycine, nystatine, triamcinolone	pommade auric.	1,5 kg	PAU						
Otostan®	crotamiton	solution auric.	NR	NR						
Program® 80	lufénurone	sol. Inj.	4 kg	AU						
Seresto®	imidacloprid + fluméthrine	collier	10 sem.	NR						
Strectis®	fipronil + méthoprène	spot on (surf)	8 sem., 0,5 kg	NR						
Stronghold®	sélamectine	spot on (syst)	6 sem.,	AU					<i>T. cati</i> , Ancylo	Larves <i>D. immitis</i>
Stronghold® Plus	sélamectine + sarolaner	spot on sys	8 sem., 1,25 kg	NR					<i>T. cati</i> , Ancylo	Larves <i>D. immitis</i> .
Vectra® Felis	dinotéfurane + pyriproxifène	spot on (surf)	7 sem., 0,6 kg	NR						

AU : peut être utilisé pendant la gestation et la lactation

NR : innocuité due au médicament vétérinaire n'a pas été établie en cas de gestation et de lactation chez les espèces cibles. L'utilisation du médicament vétérinaire chez les chattes gestantes et allaitantes ou chez les chats destinés à la reproduction doit être basée sur une évaluation bénéfique / risque par le vétérinaire responsable

PAU : l'utilisation de ce médicament est contre-indiquée