

# Schemat odrobaczania dorosłych psów

**Pies przebywa tylko w pomieszczeniach lub wychodzi na zewnątrz, ale nie ma bezpośredniego kontaktu z:**

- parkami, piaskownicami, placami zabaw
- odchodami innych psów i kotów
- ślimakami i pomrowami
- surowym mięsem
- zwierzętami drapieżnymi

**Pies wychodzi na zewnątrz i ma bezpośredni kontakt z:**

- parkami, piaskownicami, placami zabaw
- odchodami innych psów i kotów

**• zjada padlinę i/lub wychodzi na zewnątrz bez dozoru, aby polować, ma skłonność do zjadania „wszystkiego”**

**NIE**

**• zjada pomrowy i ślimaki i/lub surowe mięso lub ma dostęp do odpadów poubojowych**


**NIE**

**TAK**

**TAK**

**Pies przebywa na terenach endemicznego występowania *Echinococcus multilocularis* u lisów**

- zjada padlinę i/lub gryzienie
- wychodzi na zewnątrz bez dozoru



## Grupa A

odrobaczać 1-2 razy do roku przeciwko nicieniom lub wykonać badania kału

## Grupa B

odrobaczać 4 razy do roku przeciwko nicieniom lub wykonać badania kału

## Grupa C

odrobaczać 4-12 razy do roku przeciwko nicieniom i tasiemcom zależnie od analizy ryzyka

## Grupa D

comiesięczne odrobaczanie przeciwko tasiemcom, 4-12 razy do roku przeciwko nicieniom zależnie od analizy ryzyka

- Zabiegi odrobaczania powinny zawsze odbywać się za poradą lekarza weterynarii. Regularne badanie kału, jak sugeruje się dla grup A i B, stanowi dobrą alternatywę dla standardowego odrobaczania.
- Jeżeli nie można jednoznacznie ocenić ryzyka dla zwierzęcia, powinno ono być badane lub odrobaczane co najmniej 4 razy do roku. Badania wykazują, że odrobaczanie 1-3 razy do roku nie zapewnia wystarczającej ochrony. Odrobaczanie co 3 miesiące nie eliminuje możliwości wystąpienia zarażenia patentnego.