


# A macskák egyéni féregtelenítésének programja



MACSKÁK KIEGÉSZÍTŐ KEZELÉSEI	
<b>Orsóféreg</b>	
Kölyökmacskák	Kezelés 3 hetes kortól, aztán 2 hetenként az elválasztásig és ezután havonta 6 hónapos korig.
Vemhes macskák	A várható ellés előtt körülbelül hét nappal az emodepszid spot-on egyszeri alkalmazása megelőzi a <i>Toxocara cati</i> lárvák tejfel történő átvitelét a kölyökmacskákra.
Szoptató macskák	A kölykök első kezelésével egyidejűleg kell kezelni (lásd fent).
Macskák fokozott fertőzési kockázattal, például azok, amelyeket versenyekre, kiállításokra visznek vagy a tenyészetekben tartottak stb.	Két kezelés: az esemény előtt maximum 4 héttel és 2-4 héttel az esemény után. Tenyészetekben: havonta egyszer alkalmazni a tervezett féregtelenítést, vagy négy hetente megvizsgálni a bélsármintákat, és kezelni a leletektől függően.
Macskák, amelyek 5 éves kor alatti gyerekekkel vagy immunhiányos egyénekkel osztják meg otthonukat	A kockázatbírálástól függően havonta egyszer alkalmazni a tervezett féregtelenítést, vagy havonta megvizsgálni a bélsármintákat, és a leletek szerint kezelni.
<b>Galandféreg</b>	
Nyers húst és / vagy belsőségeket fogyaszt, zsákmányt eszik vagy vadászik	A macskákat legalább évente 4 alkalommal kell bélsárvizsgálattal ellenőrizni és a leletektől függően kezelni, vagy legalább évente 4 alkalommal féregteleníteni.
Bolha (mint a <i>Dipylidium</i> vektora) okozta fertőzöttség	Egyszer, amikor a fertőzés létrejött.
<i>Echinococcus multilocularis</i>	Macskák <i>Echinococcus multilocularis</i> petéket ritkán ürítenek és ezért a fertőzésnek kicsi a járványtani jelentősége.
<b>Szívféreg (<i>Dirofilaria immitis</i>)*</b>	
Macskák, melyek szívféregre endémiás területeken élnek	Profilaktikusan, havonta makrociklusos laktonokkal a lárvák elleni kezelés a szűnyogszezon alatt.
Utazás vagy behozatal/kivitel a szívféregre endémiás területekre/területekről	Nem később mint 30 nappal az elindulás előtt, majd 30 nappal a lehetséges utolsó utazási nap után havonta kezelés.

- A féregtelenítést mindig állatorvos szakember tanácsa alapján kell elvégezni. A bélsár rendszeres koprologiai vizsgálata, amint azt az A és B Csoportnál javasolt, jó alternatíva a szokásos féregtelenítési eljárásokkal szemben.
  - Ha egy állat egyéni kockázatát nem lehet egyértelműen megítélni, akkor az állatot évente meg kell vizsgálni vagy legalább négyszer kell féregteleníteni. Tanulmányok kimutatták, hogy az évente 1-3 alkalommal végzett féregtelenítés nem nyújt elegendő védelmet. A 3 havonta történő féregtelenítés nem feltétlenül előzi meg a patens fertőzéseket.
- \* Részletes információk a kutyák és a macskák szívféreg fertőzöttségéről az ESCCAP 5. Irányelvben található: "A kutyák és a macskák vektor közvetítette betegségei elleni védekezés" a [www.esccaphungary.hu](http://www.esccaphungary.hu), és angol, ill. egyéb nyelven a [www.esccap.org](http://www.esccap.org) oldalon.