


Schéma individuálneho odčervovania psov



DOPLNKOVÉ OŠETRENIA PRE PSOV	
Oblé červy	
Šteňatá	Prvýkrát na 14. deň po narodení, potom každé 2 týždne až do 2 týždňov po odstavení. Ak pretrváva zvýšené riziko infekcie, ošetrovanie raz za mesiac až do veku šiestich mesiacov.
Gravidné suky	Na zníženie rizika prenosu na šteňatá môžu byť gravidné suky odčervované makrocyclickými laktónmi okolo 40. a 55. dňa gravidity alebo podávaním fenbendazolu denne od 40. dňa gravidity až do 2. dňa po pôrode.
Laktujúce suky	Odčerviť pri prvom ošetrovaní šteňat (2 týždne po pôrode).
Psy so zvýšeným rizikom infekcie, napr. využívané na šport, súťaže, výstavy alebo chované v útulkoch, a pod.	Dve ošetrenia: najneskôr 2 týždne pred a 2 týždne po udalosti. Pre chovné stanice: odčerviť podľa plánu raz za mesiac alebo každé štyri týždne vyšetriť vzorky trusu a liečiť podľa výsledkov.
Pracovné psy, napr. záchranné, policajné, využívané na canisterapiu	V závislosti od vyhodnotenia rizika odčerviť podľa plánu raz za mesiac, ak je riziko infekcie pásomnicou <i>Echinococcus</i> spp. nízke, raz za mesiac vyšetriť vzorky trusu a liečiť podľa výsledkov.
Psy chované v domácnostiach s deťmi mladšími ako 5-6 rokov, imunokompromitovanými alebo staršími osobami	V závislosti od vyhodnotenia rizika odčerviť podľa plánu raz za mesiac, alebo raz za mesiac vyšetriť vzorky trusu a liečiť podľa výsledkov.
Pľúcne červy	
Pes má tendenciu požírať slimáky a slizniaky alebo s nimi prichádza do kontaktu a/alebo žerie trávu	V závislosti od individuálneho posúdenia rizika, napríklad na základe intenzity požírania slimákov/slizniakov a epidemiologickej situácie, môže byť potrebné raz za mesiac preventívne ošetrovanie.
Pásomnice	
Cestovanie alebo import do/z oblastí endemického výskytu <i>Echinococcus</i> spp.	Odčerviť psov s vysokým rizikom nákazy 4 týždne po vycestovaní a následne každé 4 týždne, pričom posledné odčervenie má byť najneskôr 4 týždne po návrate. Odčerviť bezprostredne po dovoze.
Kŕmenie surovým mäsom a/alebo vnútornosťami, požíranie korisť	Psy, ktoré sú kŕmené surovým, nedostatočne tepelne opracovaným (10 minút, vnútorná teplota 65 °C) alebo zmrazeným (1 týždeň, -17 až -20 °C) mäsom, by mali byť odčervované proti pásomniciam každé 4 týždne.
Napadnutie blchou alebo srstiarokou psou (prenášače <i>Dipylidium caninum</i>)	Jednorazovo pri potvrdení infestácii.
Srdcový červ (<i>Dirofilaria immitis</i>)¹	
Psy žijúce v oblastiach endemického výskytu <i>Dirofilaria immitis</i>	Ošetrovanie proti larvám tretieho štádia makrocyclickými laktónmi v mesačných intervaloch (alebo podľa príbalového letáku) počas sezóny výskytu komárov a 30 dní po jej skončení.
Cestovanie do oblastí endemického výskytu <i>Dirofilaria immitis</i>	Počas sezóny výskytu komárov: profylaktické ošetrovanie proti larvám tretieho štádia makrocyclickými laktónmi do 30 dní od príchodu do endemickej oblasti, následne ďalšie ošetrovania v mesačných intervaloch až do 30 dní po návrate.
Dovoz z oblastí endemického výskytu <i>Dirofilaria immitis</i>	Bezprostredne po dovoze: jednorazové profylaktické ošetrovanie proti larvám tretieho štádia makrocyclickými laktónmi. Vstupné vyšetrenie na prítomnosť infekcie ihneď pri dovoze a opakované testovanie najskôr o 6 mesiacov.

- Odčervovanie by sa malo vždy vykonávať na základe odporúčania veterinárneho lekára. Pri črevných nematodach a pľúcnych červoch môže byť alternatívou k štandardnému odčervovaniu pravidelné koprologické vyšetrenie trusu (a v prípade potreby následné odčervenie), ktoré sa vykonáva s rovnakou frekvenciou, ako je odporúčaná liečba.
- Ak nie je možné jednoznačne posúdiť individuálne riziko infekcie črevnými nematodami, pes by mal byť odčervovaný, alebo by mal byť vyšetrený trus aspoň 4-krát ročne. To isté platí aj pre infekciu pásomnicami, hoci spoľahlivosť detekcie infekcie pásomnicami vyšetrením trusu je nízka (s výnimkou *Dipylidium*, pri ktorom test na koproantigén umožňuje detekciu s vysokou citlivosťou). Preto sa odporúča liečba proti pásomniciam aspoň 4-krát ročne. Štúdie preukázali, že 1–3 odčervovania ročne neposkytujú dostatočnú ochranu.

¹ V oblastiach endemického výskytu srdcového červa môžu byť v kontakte s komármi aj psy, ktoré žijú v interiéri a sú venčené, preto je vhodné zvážiť prevenciu proti dirofilariám. Podrobné informácie o infekcii srdcovým červom u psov a mačiek nájdete v smernici ESCCAP č. 5: [Prevencia ochorení/patogénov prenášaných vektormi u psov a mačiek](#)