



ANTIPARASITARIOS EXTERNOS PARA PERROS DISPONIBLES EN ESPAÑA 2026*



Nombre comercial Laboratorio distribuidor	Principios activos	Posología **	Forma farmacéutica	Indicaciones de uso	Otras indicaciones	Precauciones especiales de uso	Equivalentes terapéuticos (laboratorio distribuidor)
Advantix - ELANCO	Imidacloprid + Permetrina	1 pipeta / 3 - 4 semanas (10 mg/kg + 50 mg/kg)	Spot on	Pulgas Garrapatas + repelente Piojos ^M Mosquitos (2-4 sem.) Flebotomos (3 sem.) Mosca de los establos (4 sem.) Tratamiento DAPP	Reducción del riesgo de infección por <i>Leishmania infantum</i>	Edad mínima: 7 semanas Peso mínimo: 1,5 kg Puede utilizarse en gestantes y lactantes	Ataxxa (LABIANA); Daclotrix (KRKA); Medicalpet (ELANCO); Menforsan (BILPER); Protectix (BEAPHAR); Pulsix (LIVISTO); Refordog (KARIZOO); Remuvet (BEAPHAR)
Advocate - ELANCO	Imidacloprid + Moxidectina	1 pipeta / mes	Spot on	Pulgas Piojos ^M Ácaros de la sarna ^{S+D+O} Tratamiento DAPP Endoparásitos ¹	—	Edad mínima: 7 semanas Peso mínimo: 1 kg Uso NO recomendado en gestantes, lactantes y reproductores	Imoxat (LIVISTO); Prinovox (FATRO)
Bravecto comprimidos - MSD	Fluralaner	1 comprimido / 3 meses (25-56 mg/kg)	Comprimidos masticables	Pulgas Garrapatas Ácaros de la sarna ^{D+S} Tratamiento DAPP	Reducción del riesgo de infección por <i>Dipylidium caninum</i> Reducción del riesgo de infección por <i>Babesia canis</i>	Edad mínima: 8 semanas Peso mínimo: 2 kg Seguridad demostrada en gestantes, lactantes y reproductores	—
Bravecto solución - MSD	Fluralaner	1 Pipeta / 3 meses (25-56 mg/kg)	Spot on	Pulgas Garrapatas Ácaros de la sarna ^{D+S} Tratamiento DAPP	Reducción del riesgo de infección por <i>Dipylidium caninum</i> Reducción del riesgo de infección por <i>Babesia canis</i>	Edad mínima: 8 semanas Peso mínimo: 2 kg Seguridad demostrada en gestantes, lactantes y reproductores	—
Bravecto inyectable - MSD	Fluralaner	0,1 ml / kg / 12 meses (15 mg/kg)	Inyectable	Pulgas Garrapatas Tratamiento DAPP	Reducción del riesgo de infección por <i>Dipylidium caninum</i> Reducción del riesgo de infección por <i>Babesia canis</i>	Edad mínima: 6 meses Seguridad NO demostrada en gestantes y lactantes	—
Bravecto TriUno - MSD	Fluralaner + Moxidectina + Pirantel	1 comprimido / mes (10-20 mg/kg + 0,025-0,05 mg/kg + 5-10 mg/kg)	Comprimidos masticables	Pulgas Garrapatas Tratamiento DAPP Endoparásitos ¹	Reducción del riesgo de infección por <i>Dipylidium caninum</i> Reducción del riesgo de infección por <i>Babesia canis</i>	Edad mínima: 8 semanas Peso mínimo: 1,27 kg Precaución en perros con trastornos neurológicos Uso NO recomendado en gestantes, lactantes y reproductores	—
Capstar - ELANCO	Nitenpiram	1 comprimido (1 mg/kg)	Comprimidos	Pulgas	—	Edad mínima: 4 semanas Peso mínimo: 1 kg Puede utilizarse en gestantes y lactantes	—
Credelio - ELANCO	Lotilaner	1 comprimido / mes (20-43 mg/kg)	Comprimidos masticables	Pulgas Garrapatas Ácaros de la sarna ^{D+S} Tratamiento DAPP	Reducción del riesgo de infección por <i>Babesia canis</i>	Edad mínima: 8 semanas Peso mínimo: 1,3 kg Seguridad NO demostrada en gestantes, lactantes y reproductores	Adtab (ELANCO)
Credelio Plus - ELANCO	Lotilaner + Milbemicina oxima	1 comprimido / mes (20-41 mg/kg + 0,75-1,53 mg/kg)	Comprimidos masticables	Pulgas Garrapatas Ácaros de la sarna ^{D+S} Tratamiento DAPP Endoparásitos ¹	Reducción del riesgo de infección por <i>Babesia canis</i>	Edad mínima: 8 semanas Peso mínimo: 1,4 kg Seguridad NO demostrada en gestantes, lactantes y reproductores	—
Dixie suspensión antiparasitaria - QUIMICA DE MUNGUIA	Tetrametrina	Solución tópica / 6-8 semanas	Solución tópica	Pulgas Piojos	—	No aplicar sobre heridas abiertas o piel dañada Uso NO recomendado en gestantes y lactantes	—
Effipro duo - VIRBAC	Fipronilo + Piriproxifeno	1 pipeta (6,7 mg/kg + 2 mg/kg)	Spot on	Pulgas Garrapatas Tratamiento DAPP	—	Edad mínima: 10 semanas Peso mínimo: 2 kg Seguridad NO demostrada en gestantes y lactantes	—
Effitix - VIRBAC	Fipronilo + Permetrina	1 pipeta / mes (6,7 mg/kg + 60 mg/kg)	Spot on	Pulgas Garrapatas Mosquitos Flebotomos Tratamiento DAPP	—	Edad mínima: 12 semanas Peso mínimo: 1,5 kg Seguridad NO demostrada en gestantes y lactantes	Caniguard Duo (BEAPHAR)
Effipro - VIRBAC	Fipronilo	1 pipeta / 4-8 semanas**	Spot on	Pulgas Garrapatas Tratamiento DAPP	—	Edad mínima: 8 semanas Peso mínimo: 2 kg Seguridad NO demostrada en gestantes y lactantes	Diptron (QUIMUNSA); Dixie (QUIMUNSA); Effinol (CALIER); Fiprex (CHEMICAL IBERICA); Flevox (VETOQUINOL); Lifronil (ZOTAL); Pestigon (KARIZOO)
Frontline Combo - BOEHRINGER INGELHEIM	Fipronilo + (S)-metopreno	1 pipeta / mes (6,7 mg/kg + 6 mg/kg)	Spot on	Pulgas + IGR Garrapatas Piojos ^M Tratamiento DAPP	—	Edad mínima: 8 semanas Peso mínimo: 2 kg Puede utilizarse en gestantes y lactantes	Amflee Combo (KRKA); Comboline (BOEHRINGER INGELHEIM); Dynacan (CALIER); Fleatix (PETIA); Fipronilo-(S)-metopreno (CEVA); Fiprex Duo (CHEMICAL IBERICA); Fiprosmet (FATRO IBERICA)
Frontline Spray - BOEHRINGER INGELHEIM	Fipronilo	3 - 6 ml/kg / mes (7,5-15 mg/kg)	Spray	Pulgas Garrapatas Piojos ^M Tratamiento DAPP	—	Puede utilizarse en gestantes y lactantes	Effinol (CALIER); Fiprotec (BEAPHAR)
Frontline Tri-Act - BOEHRINGER INGELHEIM	Fipronilo + Permetrina	1 pipeta / mes (6,76 mg/kg + 50,48 mg/kg)	Spot on	Pulgas Garrapatas + repelente Mosquitos Flebotomos Mosca de los establos Tratamiento DAPP	Reducción del riesgo de infección por <i>Leishmania infantum</i>	Edad mínima: 8 semanas Peso mínimo: 2 kg Seguridad NO demostrada en gestantes, lactantes y reproductores	Caniguard Duo (BEAPHAR)
NexGard - BOEHRINGER INGELHEIM	Afoxolaner	1 comprimido / mes (2,7-7 mg/kg)	Comprimidos masticables	Pulgas Garrapatas Ácaros de la sarna ^{D+S+O} Tratamiento DAPP	Reducción del riesgo de infección por <i>Dipylidium caninum</i> Reducción del riesgo de infección por <i>Babesia canis</i>	Edad mínima: 8 semanas Peso mínimo: 2kg Puede utilizarse en gestantes, lactantes y reproductoras Seguridad NO demostrada en machos reproductores	Frontpro (BOEHRINGER INGELHEIM)
NexGard Spectra - BOEHRINGER INGELHEIM	Afoxolaner + Milbemicina oxima	1 comprimido / mes (2,5-5,36 mg/kg + 0,5-1,07 mg/kg)	Comprimidos masticables	Pulgas Garrapatas Ácaros de la sarna ^{D+S+O} Tratamiento DAPP Endoparásitos ¹	Reducción del riesgo de infección por <i>Dipylidium caninum</i> Reducción del riesgo de infección por <i>Babesia canis</i>	Edad mínima: 8 semanas Peso mínimo: 1,35kg Puede utilizarse en gestantes, lactantes y reproductoras Seguridad NO demostrada en machos reproductores	—
Piretron - QUIMICA DE MUNGUIA	Permetrina	1 pipeta / mes	Spot on	Pulgas Garrapatas Piojos Mosquitos Flebotomos	—	Edad mínima: 2 semanas No se han descrito contraindicaciones en gestantes y lactantes	—
Sarnacurán - ELANCO	Foxima	Consultar en ficha técnica	Solución tópica	Pulgas Garrapatas Ácaros de la sarna ^{D+S}	—	Puede utilizarse en gestantes y lactantes	—
Seresto collar - ELANCO	Imidacloprid + Flumetrina	1 collar / 7-8 meses	Collar	Pulgas + larvicida Garrapatas + repelente Piojos Flebotomos Tratamiento DAPP	Reducción del riesgo de transmisión de <i>Babesia canis vogeli</i> y <i>Ehrlichia canis</i> Reducción del riesgo de transmisión de <i>Leishmania infantum</i>	Edad mínima: 7 semanas Uso NO recomendado en gestantes y lactantes	—
Simparica - ZOETIS	Sarolaner	1 comprimido / 5 semanas (2-4 mg/kg)	Comprimidos masticables	Pulgas Garrapatas Ácaros de la sarna ^{S+D+O} Tratamiento DAPP	Reducción del riesgo de infección por <i>Babesia canis canis</i>	Edad mínima: 8 semanas Peso mínimo: 1,3 kg Uso NO recomendado en gestantes, lactantes y reproductores	—
Simparica Trio - ZOETIS	Sarolaner + Moxidectina + Pirantel	1 comprimido / 5 semanas (1,2-2,4 mg/kg + 0,024-0,048 mg/kg + 5-10 mg/kg)	Comprimidos masticables	Pulgas Garrapatas Ácaros de la sarna ^{D+S} Tratamiento DAPP Endoparásitos ¹	—	Edad mínima: 8 semanas Peso mínimo: 1,25 kg Uso NO recomendado en gestantes, lactantes y reproductores	—
Scalibor collar - MSD	Deltametrina	1 collar / 4-6-12 meses (según especie destino)	Collar	Pulgas (4 meses) Garrapatas (6 meses) Mosquitos (6 meses) Flebotomos (12 meses)	Prevención de la infección por <i>Leishmania infantum</i>	Edad mínima: 7 semanas Sin efectos secundarios en gestantes y lactantes	Canuc (DIPTRON); Canishield (BEAPHAR); Frontal Delta (ZOTAL); Medicalpet (BEAPHAR); Merlin (CALIER); Prevendog (VIRBAC); Remuvet (BEAPHAR); Vetiker (VETPHARMA)
Stronghold - ZOETIS	Selamectina	1 pipeta / mes	Spot on	Pulgas + IGR Piojos ^M Ácaros de la sarna ^{S+O} Tratamiento DAPP Endoparásitos ¹	—	Edad mínima: 6 semanas Puede ser utilizado en gestantes, lactantes y reproductoras	Chanhold (FATRO IBERICA); Evicto (VIRBAC); Selehold (LABIANAPETS)
Taberdog champú - DFV	Tetrametrina + Butóxido de piperonilo	Consultar ficha técnica	Champú	Pulgas Garrapatas Piojos Ácaros (no sarna)	—	No se han descrito contraindicaciones en gestantes y lactantes	—
Taberdog collar Dimpilato - DFV	Dimpilato	1 collar / 4 meses	Collar	Pulgas Garrapatas	—	Edad mínima: 6 meses NO utilizar en gestantes y lactantes	Dixie (QUIMUNSA); Zotalin (ZOTAL)
Taberdog collar Permetrina - DFV	Permetrina	1 collar / 4 meses	Collar	Pulgas Garrapatas Piojos ^S Mosquitos Mosca de los establos	—	No se han descrito contraindicaciones en gestantes y lactantes	—
Vectra 3D - CEVA	Dinotefuran + Piriproxifeno + Permetrina	1 pipeta / mes	Spot on	Pulgas + IGR Garrapatas + repelente Mosquitos Flebotomos Mosca de los establos	—	Edad mínima: 7 semanas Peso mínimo: 1,5 kg Seguridad NO demostrada en gestantes y lactantes	—

(*) Información obtenida de las fichas técnicas registradas en la AEMPS.
(**) Posología a criterio del veterinario en función de los riesgos.

IGR: regulador del crecimiento de los insectos.
DAPP: dermatitis alérgica a la picadura de pulgas.
(1) Consultar la tabla de antiparasitarios internos para información más detallada.

Piojos: M: Masticadores (Orden Mallophaga)
P: Picadores (Orden Anoplura)
Ácaros de la sarna: D: Demodex canis
S: Sarcoptes scabiei
O: Otodectes cynotis