

Schemat odrobaczania dorosłych kotów

Kot przebywa tylko w domu

Ryzyko zarażenia stadiami inwazyjnymi robaków jest niskie, zjedanie gryzoni mało prawdopodobne

Grupa A

Wykonać badania kału 1-2 razy do roku (i odrobaczać w zależności od wyników) lub odrobaczać 1-2 razy do roku przeciwko nicieniom

Kot swobodnie wychodzi na zewnątrz

Ryzyko zarażenia stadiami inwazyjnymi robaków jest wysokie, zjedanie gryzoni wysoce prawdopodobne

Grupa B

W celu zminimalizowania ryzyka wydalania jaj *Toxocara* i *Taenia* wykonać badania kału przynajmniej 4 razy do roku (i odrobaczać w zależności od wyników) lub odrobaczać przeciwko nicieniom i tasiemcom* przynajmniej 4 razy do roku

(*zarażenia *Taenia taeniaeformis* są częste, natomiast koty sporadycznie wydalają jaja *E. multilocularis*, w związku z tym ta inwazja nie ma istotnego znaczenia epidemiologicznego)



- Zabiegi odrobaczania powinny zawsze odbywać się za poradą lekarza weterynarii. Regularne badanie kału, jak sugeruje się dla grup A i B, stanowi dobrą alternatywę dla standardowego odrobaczania..
- Jeżeli nie można jednoznacznie ocenić ryzyka dla zwierzęcia, powinno ono być badane lub odrobaczane co najmniej 4 razy do roku. Badania wykazują, że odrobaczanie 1-3 razy do roku nie zapewnia wystarczającej ochrony. Odrobaczanie co 3 miesiące nie eliminuje możliwości wystąpienia zarażenia patentnego.